Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului:	D-HDL
Tipul (tipurile) de produs (produse):	TP 01 - Igienă umană TP 01 - Igienă umană
Numărul curent:	EU-0027467-0000
Numărul curent R4BP 3:	EU-0027467-0005

Cuprins

Informații administrative 1

1.1. Denumirea comercială a produsului 1

1.2. Detinatorul autorizației 1

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide 1

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active 2

2. Compoziția și formularea produsului 3

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid 3

2.2. Tipul preparatului 3

3. Fraze de pericol și de precauție 4

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate) 4

5. Direcții generale de utilizare 8

5.1. Instrucțiuni de utilizare 8

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor 8

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului 9

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia 9

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare 9

6. Alte informații 10

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

D-HDL

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Knieler & Team GmbH
	Adresa	Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Germania
Numărul curent	EU-0027467-0000 1-3	

Numărul curent R4BP 3	EU-0027467-0005
Data autorizației	11/08/2022
Data de expirare a autorizației	31/07/2032

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Knieler & Team GmbH
Adresa producătorului	Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Germania
Adresa locurilor de producție	Knieler & Team GmbH, Kattrepelsbrücke 1 20095 Hamburg Germania
	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Germania

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa	1354 - Propan-1-ol
Numele producatorului	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
Adresa producătorului	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Germania
Adresa locurilor de producție	OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Statele Unite

Substanța activa	1354 - Propan-1-ol
Numele producatorului	BASF SE
Adresa producătorului	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germania
Adresa locurilor de producție	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germania

Substanța activa	1354 - Propan-1-ol
Numele producatorului	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Africa de Sud
Adresa locurilor de producție	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Africa de Sud

Substanța activa	1355 - Propan-2-ol
Numele producatorului	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Germania
Adresa locurilor de producție	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Germania

Substanța activa	1355 - Propan-2-ol
Numele producatorului	Brenntag GmbH
Adresa producătorului	Stinnes-Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Germania
Adresa locurilor de producție	Shell Nederland Raffinaderij B.V. 3196 KK Rotterdam-Pernis Țările de Jos
	Exxon Mobil LA 70805 Baton Rouge Statele Unite

Substanța activa	1355 - Propan-2-ol
Numele producatorului	INEOS Solvent Germany GmbH
Adresa producătorului	Römerstrasse 733 47443 Moers Germania
Adresa locurilor de producție	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Germania
	INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Germania

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Propan-1-ol		Substanța activă	71-23-8	200-746-9	12,229
Propan-2-ol		Substanța activă	67-63-0	200-661-7	62,751

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	Lichid şi vapori foarte inflamabili. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Fraze de precauție	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis. Păstraţi recipientul închis etanş. Evitaţi să inspirați vaporii. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. ÎN CAZ DE INHALARE:Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medic/medic. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.A se păstra la rece. A se depozita sub cheie. Aruncaţi recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Dezinfectant igienic, lichid

Tipul produsului	TP 01 - Igienă umană
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nerelevant.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea stiintifica: other denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea stiintifica: other denumirea comună: Tuberculosis bacilli etapă de dezvoltare: nu există date

	denumirea stiintifica: other denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date denumirea stiintifica: other denumirea comună: Enveloped viruses etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior - spitale și alte instituții de sănătate, ambulanțe, intervenții chirurgicale, aziluri de bătrâni (inclusiv îngrijirea la domiciliu a pacienților) - cantine de spital, bucătării mari, industrii farmaceutice, centre de producție și laboratoare: dezinfectează igienic mâinile care devin vizibil curate și uscate. - exclusiv pentru uz profesional.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliata: frecare
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Dozaj: Cel puțin 3 ml (utilizați dozatoare: de exemplu setați la 1,5 ml pe cursă, 2 curse pe 3 ml) Timp de contact: 30 s Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Nu există restricții în ceea ce privește numărul și momentul aplicațiilor. Între fazele de aplicare nu trebuie să se țină cont de intervale de siguranță. Produsul poate fi utilizat în orice moment și de câte ori este necesar.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	100, 125, 150, 500, 1000 ml în flacoane polietilenă de înaltă densitate (HDPE) transparente/albe cu capace din polipropilenă (PP); Recipient HDPE transparent/alb de 5000 ml cu capac filetat HDPE. În plus, exclusiv pentru D-HDL (produs 3.1): 100, 125, 150, 500, 1000 ml cu flacoane HDPE albe cu capace cu clapă superioară PP; recipient HDPE alb de 5000 ml cu capac filetat HDPE de 5000 ml. În plus, exclusiv pentru B-HDL (produs 3.3): 700 ml de pungă din folie compozită transparentă PE cu pompă de PP integrată; flacon din HDPE de 75 ml transparent/alb cu capac cu clapă superioară PP.

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produsele pot fi aplicate direct sau produsele pot fi utilizate într-un dozator sau împreună cu o pompă. Pentru dezinfectarea igienică a mâinilor, folosiți 3 ml de produs și țineți mâinile umede timp de 30 de secunde.
Nu reumpleți.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Dezinfectant chirurgical, lichid

Tipul produsului	TP 01 - Igienă umană
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nerelevant.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea stiintifica: other denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea stiintifica: other denumirea comună: Tuberculosis bacilli etapă de dezvoltare: nu există date denumirea stiintifica: other denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date denumirea stiintifica: other denumirea comună: enveloped viruses etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

	de interior Produsul poate fi aplicat pentru detergentul folosit în intervenții chirurgicale în spitale și în alte instituții de asistență medicală: dezinfectează în intervenții chirurgicale mâinile și antebrațele care devin vizibil curate și uscate. Exclusiv pentru uz profesional.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliata: frecare
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Dozaj: Frecați o cantitate suficientă în porțiuni de 3 ml (utilizați dozatoare: de exemplu setați la 1,5 ml pe cursă, 2 curse la 3 ml). Durată de contact: 90 s Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Nu există restricții în ceea ce privește numărul și momentul aplicațiilor. Între fazele de aplicare nu trebuie să se țină cont de intervale de siguranță. Produsul poate fi utilizat în orice moment și de câte ori este necesar.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	100, 125, 150, 500, 1000 ml în flacoane polietilenă de înaltă densitate (HDPE) transparente/albe cu capace din polipropilenă (PP); Recipient HDPE transparent/alb de 5000 ml cu capac filetat HDPE. În plus, exclusiv pentru D-HDL (produs 3.1): 100, 125, 150, 500, 1000 ml cu flacoane HDPE albe cu capace cu clapă superioară PP; recipient HDPE alb de 5000 ml cu capac filetat HDPE de 5000 ml. În plus, exclusiv pentru B-HDL (produs 3.3): 700 ml de pungă din folie compozită transparentă PE cu pompă de PP integrată; flacon din HDPE de 75 ml transparent/alb cu capac cu clapă superioară PP.

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Produsele pot fi aplicate direct sau produsele pot fi utilizate într-un dozator sau împreună cu o pompă. Pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor, folosiți cât mai multe porțiuni de 3 ml, după caz, pentru a menține mâinile umede timp de 90 de secunde.
Nu reumpleți.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

4.2.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

4.2.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

4.2.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare ale meta SPC 3

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Exclusiv pentru uz profesional.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Evitați contactul cu ochii.

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Măsuri de prim ajutor generale: Îndepărtați persoana afectată de zona contaminată. Dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul/solicitați asistență medicală. Dacă este posibil, afișați această fișă.

ÎN CAZ DE INHALARE: Deplasați-vă la aer proaspăt și mențineți-vă în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE PROBLEME CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu apă din abundență. Apoi dezbrăcați toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă, timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați clătirea timp de cel puțin 15 minute. Apelați 112/ambulanța pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic: De asemenea, ochii trebuie să fie clătiți în mod repetat până a ajunge la medic, în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi precum acidul acetic, acidul toxic sau acidul propionic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dacă persoana expusă poate înghiți, dați-i ceva să bea. NU provocați voma. Apelați 112/ambulanța pentru asistență medicală.

Măsuri de eliberare accidentală:

Opriţi scurgerea, dacă puteți face acest lucru în condiții de siguranță. Eliminați sursele de aprindere. Acordați o atenție deosebită evitării sarcinilor electrice statice. Nu există flăcări deschise. Fumatul interzis.

Împiedicați intrarea în canalizare și în apele publice.

Ștergeți cu material absorbant (de exemplu, o cârpă). Înmuiați scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau diatomitul, cât mai curând posibil. Strângeți în mod mecanic (cu mătura, cu lopata). A se arunca în conformitate cu reglementările locale relevante.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările oficiale. Nu goliți în canalizări. Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere. Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor. Goliți ambalajul complet înainte de aruncare. Când sunt complet goale, recipientele sunt reciclabile ca orice alte ambalaje.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Durata de depozitare: 24 de luni

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se feri de lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare recomandată: 0 - 30 °C

A nu se păstra la temperaturi sub 0°C

Nu depozitați în apropierea alimentelor, băuturilor și animalelor de alăptare. Feriți-vă de materialele combustibile.

6. Alte informații