

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Maxforce IC

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/19-12/17

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0020999-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	2
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	6

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Maxforce IC

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES CER RO S.R.L.
	Adresa	Piața Charles de Gaulle nr. 15, Charles de Gaulle Plaza, etaj 3 Biroul 303, Sector 1, 011857 București Rumunjska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/19-12/17	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0020999-0000	
Datum odobrenja	08/07/2019	
Datum isteka odobrenja	29/01/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Adresa proizvođača	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Francuska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	37 - Imidaklopid
Naziv proizvođača	Bayer AG
Adresa proizvođača	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Chempark D-41538 Dormagen Njemačka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna tvar	138261-41-3	428-040-8	2,217

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Sadrži 1,2-benzisotiazolin-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto. Odložiti spremnik u/na skladu s važećim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	VII.2 Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Blattella germanica Uobičajeno ime: Smeđi žohar Stadij razvoja: Odrasle jedinke i nimfe Znanstveno ime: Blatta orientalis Uobičajeno ime: Crni žohar Stadij razvoja: Odrasle jedinke i nimfe Znanstveno ime: Periplaneta americana Uobičajeno ime: američki žohar Stadij razvoja: Odrasle jedinke i nimfe Znanstveno ime: Supella longipalpa Uobičajeno ime: Smeđe-prugasti žohar Stadij razvoja: Odrasle jedinke i nimfe
Područje primjene	u zatvorenom prostoru IV.1. U zatvorenim prostorima IV.1.3 Za primjenu u: IV.1.3.1 Industrijskim/komercijalnim objektima IV.1.3.2 Domaćinstvima/privatnim prostorima IV.1.3.3 Javnim zgradama (npr. bolnice, domovi za starije osobe)
Načini primjene	Metoda: Postavljanje mamaca Detaljan opis: Postavljanje mamaca
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 1-3 kapi x 0,1 g Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Primijeniti Maxforce White IC kao kapi ili tanke trake gela na površine u identificiranim ciljnim područjima. Gel se može postaviti u kutove, pukotine, procjepe i utore. Doza primjene prilagođava se jačini infestacije. Jedna kap = 0,1 g (kap promjera otprilike 7 mm) Gel se može primijeniti i postavljanjem tanke trake gela koja odgovara količini od 0,1 g. Vrste žohara Doza primjene ovisno o jačini infestacije * po m2 Slaba Jaka Male vrste žohara npr. Smeđi žohar Jedna kap x 0,1 g Dvije kapi x 0,1 g Smeđe-prugasti žohar

	<p>Velike vrste žohara npr. Crni žohar Američki žohar Dvije kapi x 0,1 g Tri kapi x 0,1 g</p> <p>* Maksimalna doza primjene 3 x 0,1 g po m2. Ponoviti primjenu 3 – 11 puta godišnje u istom objektu. Kod primjene utrošak gela ne bi smio prelaziti najveće količine primjene od: • 60 x 0,1 g (tj. 6 g gela) po domaćinstvu; • 270 x 0,1 g (tj. 27 g gela) u većoj zgradi. Ako je potrebno postaviti veće količine gela, tada u zatvorenom prostoru treba koristiti kutijice za izlaganje mamca.</p>
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Plastični spremnik (spremnik od PP i PE sa PE vrhom i čepom) od 20 – 30 g

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Proizvod se primjenjuje odgovarajućim aplikatorom za gel. Kada je tretiranje završeno, skinuti prazan spremnik s aplikatora i zbrinuti ga na siguran način. Ako je u spremniku ostalo nepotrošenog proizvoda, skinuti spremnik s aplikatora, zatvoriti ga čepom i čuvati prema uputama.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

**ISKLUČIVO ZA PRIMJENU KAO INSEKTICID
SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU**

Ne primjenjivati proizvod izravno na površine na kojima se čuva, priprema ili konzumira hrana za ljude i životinje.

Primijeniti samo na mjestima koja su nedostupna djeci i životinjama.

Spriječiti djeci i životinjama pristup mamcu.

Oprati ruke i izloženu kožu prije obroka i nakon uporabe.

Ostaci gela (mamca) i njegov spremnik moraju se zbrinuti na siguran način.

Samo za primjenu u zatvorenim prostorima.

Opasno za pčele.

Neiskorišten proizvod ne ispuštati u tlo, vodotokove, cjevovode (sudoper, WC...) i odvođe.

Prije uporabe obvezno uvijek pročitati naljepnicu ili letak proizvoda te slijediti sve navedene upute za uporabu.

Ne primjenjivati proizvod na mjestima koja se redovito peru (mokra čišćenje).

Ako se stvrdnuti ostaci gela uklone spužvom ili mokrom tkaninom, sav gel i onečišćeni materijal (spužva, tkanina itd.) moraju se zbrinuti na siguran način kao otpad iz kućanstva.

Ne koristiti proizvod na mjestima gdje postoji ili se sumnja na otpornost na aktivnu tvar.

U slučaju ponovne infestacije, ponoviti primjenu proizvoda. Paziti da se ne prekorači najveći dopušteni godišnji broj tretiranja.

Obvijestiti nositelja odobrenja ako je tretiranje neučinkovito.

Prije tretiranja, ako je moguće, ukloniti izvore hrane za žohare (otpad, ostatke hrane...) iz prostora koji se tretira da se potakne konzumacija gela.

Ne primjenjivati proizvod na upijajućim površinama.

Primijeniti gel udaljeno od sunčeve svjetlosti ili izvora topline (radijatora).

Izbjegavati kontinuiranu uporabu proizvoda.

Proizvod izmjenjivati s proizvodima koji sadrže aktivne tvari s drugačijim načinom djelovanja.

Proizvod primijenti samo na zaklonjenim, skrivenim mjestima do kojih teško dopire voda, kao što su pukotine i utori. Usvojiti mjere integriranog suzbijanja štetnika kao što su kombinacija kemijskih i fizikalnih mjera suzbijanja te drugih javnozdravstvenih mjera, uzimajući u obzir lokalne specifičnosti (klimatske uvjete, ciljne vrste, uvjete primjene itd.).

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Opće mjere

Izvesti osobu iz kontaminiranog područja. Unesrećenu osobu postaviti i transportirati u stabilnom položaju (bočni ležeći položaj). Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i zbrinuti je na siguran način.

Gutanje:

Isprati usta vodom. Kontaktirati toksikologa. Odmah potražiti savjet liječnika ako se pojave simptomi i/ili ako je progutana velika količina proizvoda. U slučaju da je osoba bez svijesti, postaviti osobu u bočni ležeći položaj i odmah potražiti savjet liječnika. Ne davati osobi da pije tekućinu i ne izazivati povraćanje.

Pripremite na uvid spremnik ili naljepnicu proizvoda. Ako je potrebno, odvesti unesrećenu osobu u bolnicu i pokazati naljepnicu ili pakiranje proizvoda. Unesrećenu osobu ne ostavljati bez nadzora.

Dodir s kožom:

Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Oprati kontaminiranu kožu vodom i sapunom. Kontaktirati toksikologa ako se pojave simptomi. Potražiti pomoć liječnika ako se pojavi nadraživanje kože.

Dodir s očima:

Isprati odmah s mnogo vode, također i ispod očnih kapaka, ispirati najmanje 15 minuta. Ne zaboraviti ukloniti kontaktna leće, ako ih osoba nosi.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Neiskorišteni proizvod ne ispuštati u tlo, vodotokove, cjevovode (sudoper, WC...) i odvode.

P501: Odložiti spremnik u skladu s važećim propisima.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Čuvati u originalnom spremniku.

Čuvati na hladnom, suhom i prozračnom mjestu.

Zaštititi od smrzavanja.

Čuvati udaljeno od izravne sunčeve svjetlosti.

Rok valjanosti je do 24 mjeseca.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Vidi 4.1.1

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Vidi 4.1.2

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 4.1.3

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 4.1.4

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Vidi 4.1.5

6. Ostale informacije