

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Clothianidin RB 1

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
(zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/20-12/07

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0026222-0000

Sadržaj

| | |
|--|---|
| Administrativne informacije | 1 |
| 1.1. Trgovački naziv proizvoda | 1 |
| 1.2. Nositelj odobrenja | 1 |
| 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda | 1 |
| 1.4. Proizvođači aktivnih tvari | 1 |
| 2. Sastav i formulacija proizvoda | 2 |
| 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda | 2 |
| 2.2. Vrsta formulacije | 2 |
| 3. Oznake opasnosti i obavijesti | 2 |
| 4. Odobrena uporaba | 3 |
| 5. Opće upute za uporabu | 5 |
| 5.1. Upute za uporabu | 5 |
| 5.2. Mjere za smanjenje rizika | 5 |
| 5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša | 6 |
| 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže | 6 |
| 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja | 6 |
| 6. Ostale informacije | 7 |

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

MAXFORCE PLATIN

1.2. Nositelj odobrenja

| | |
|--|---|
| Naziv i adresa nositelja odobrenja | Naziv Bayer d.o.o. |
| | Adresa Radnicka cesta 80 10000 Zagreb Hrvatska |
| Broj odobrenja | KLASA:UP/I-543-04/20-12/07 |
| Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) | HR-0026222-0000 |
| Datum odobrenja | 23/07/2019 |
| Datum isteka odobrenja | 15/07/2024 |

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

| | |
|-----------------------------|---|
| Naziv proizvođača | Bayer S.A.S.- Division Crop Science |
| Adresa proizvođača | 16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Cedex 09 Francuska |
| Lokacija proizvodnih pogona | Bayer SAS - Division Crop Science - Site Marle, Z.I. Antoine Laurent de Lavoisier F-02250 Marle-sur-Serre Francuska |
| | Norbert/ Jacobson Co.—3060 Southpark Blvd 30294 Ellenwood, Georgia Sjedinjene Američke Države |

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

| | |
|-----------------------------|---|
| Aktivna tvar | 15 - (E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogvanidin (klotianidin) |
| Naziv proizvođača | Bayer AG |
| Adresa proizvođača | Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Njemačka |
| Lokacija proizvodnih pogona | Bayer AG - Chempark 41538 Dormagen Njemačka |

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|--|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| (E)-1-(2-kloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitrogvanidin (klotianidin) | | Aktivna tvar | 210880-92-5 | 433-460-1 | 1,026 |

2.2. Vrsta formulacije

RB-mamac (pripremljen za uporabu) - gel

3. Oznake opasnosti i obavijesti

| | |
|-------------------|---|
| Oznaka upozorenja | Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on-a i 2-metil-2H-izotiazol-3-on-a. Može izazvati alergijsku reakciju. |
| Oznake obavijesti | Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju otpada. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto. |

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Insekticidni mamac u gelu spreman za uporabu za suzbijanje mladih i odraslih žohara i sivih srebrnih ribica.

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Insekticid

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Periplaneta americana
Uobičajeno ime: Američki žohar
Stadij razvoja: Ličinke (nimfe) i odrasli

Znanstveno ime: Blatta orientalis
Uobičajeno ime: Crni žohar
Stadij razvoja: Ličinke (nimfe) i odrasli

Znanstveno ime: Blattella germanica
Uobičajeno ime: Smeđi žohar
Stadij razvoja: Ličinke (nimfe) i odrasli

Znanstveno ime: Ctenolepisma longicaudatum
Uobičajeno ime: Sive srebrne ribice
Stadij razvoja: Populacija mješovitih razvojnih oblika

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Insekticidni mamac u gelu spreman za uporabu za suzbijanje mladih i odraslih žohara.
Za uporabu u:

- Kućanstvu
- Prostorima za rukovanje/skladištenje hrane
- Javnim zgradama
- Malim kućicama za životinje npr. zoološki vrtovi, trgovine za kućne ljubimce, štenare, veterinarske ordinacije, laboratorijske kućice za životinje itd. (samo zgrade, prostorije za rukovanje i skladištenje hrane, isključujući staje, torovi za životinje i kavezni u kojima se nalaze životinje).

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca

Detaljan opis:

Biocidni proizvod se nanosi pomoću odgovarajućeg aplikatora za gel ili šprice.

Broj i vremenski raspored primjene

Stopa primjene: 0.1 - 0.3 g /m²

Razrjeđivanje (%): -

Broj i vremenski raspored primjene:

Primjena gel mamac prema infestaciji i vrsti žohara:

1) Protiv ličinki žohara tj. nimfa i odraslih smedih žohara (Blattella germanica):

- koristiti 0,1 g/m² (mala do umjerena infestacija, tj. žohari jedva vidljivi tijekom dana).

- koristiti 0,2 g/m² (velika infestacija tj. žohari često vidljivi tijekom dana) tako da se na 2 mjesta stavi 0,1 g/m².

Mamci moraju ostati na mjestu najmanje 14 dana za optimalnu učinkovitost. Mjesec dana nakon toga mogu se ponovno staviti nove količine gela ako su žohari još uvijek vidljivi.

2) Protiv velikih žohara tj. nimfa i odraslih crnih žohara (Blatta orientalis) koristiti 0,2

g/m² tako da se na 2 mesta stavi 0,1 g/m². Mamci moraju ostati na mjestu najmanje 4 tjedana za optimalnu učinkovitost. Ako su žohari još uvijek vidljivi, mogu se ponovno staviti nove količine gela.
3) Protiv nimfa i odraslih američkih žohara (*Periplaneta americana*) koristiti 0,2 g/m² ili 0,3 g/m² tako da se na 2 ili 3 mesta stavi 0,1 g/m². Mamci moraju ostati na mjestu najmanje 12 tjedana za optimalnu učinkovitost. Ako su žohari još uvijek vidljivi, mogu se ponovno staviti nove količine gela.
4) Protiv sivih srebrnih ribica (*Ctenolepisma longicaudatum*) koristiti 0,1422 g/m². Mamci moraju ostati na mjestu najmanje 8 tjedana za optimalnu učinkovitost. Ako su sive srebrne ribice još uvijek vidljive, mogu se ponovno staviti nove količine gela.

Kapljica promjera 7 mm odgovara 0,1 g gela.

Ne nanositi više od jednom mjesecno.

Kategorije korisnika

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

profesionalac

Spremnik i šprica, izrađen od plastika (PE): 10 - 30 g
- dolazi s kapicom (aplikator se može ponovno zatvoriti; klip se isporučuje s aplikacijskim kanalima, u komercijalnim pakiranjima (PP))

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidi odjeljke 5.1 i 6

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Uvijek prije uporabe pročitati etiketu ili letak i slijediti dane upute.

- Biocidni proizvod se nanosi pomoću odgovarajućeg aplikatora za gel. Po završetku tretiranja izvaditi prazan spremnik i sigurno ga odložiti. Ako je spremnik iskorišten samo djelomično, treba ga izvaditi iz aplikatora, zatvoriti priloženom kapicom i spremiti prema uputama.

- Prije tretiranja, profesionalni korisnici moraju pregledati površine koje će se tretirati kako bi se utvrdila mjesta infestacije žohara i sivih srebrnih ribica, npr. korištenjem zamki i/ili aerosola, traženjem prisutnosti tragova žohara poput izmeta, kože i jajača itd...

- Za maksimalnu učinkovitost proizvod mora biti smješten u i oko skloništa žohara i, ako je moguće, između tih područja i izvora hrane.

Osim toga, za optimalnu učinkovitost, svi prirodni izvori hrane za žohare moraju se ukloniti iz područja infestacije kako bi se potaknulo konzumiranje mamca (gel mamca).

Biocidni proizvod treba postaviti u obliku točkica/kapljica veličine 7 mm u blizini uglova, pukotina i šupljina (npr. iza ili ispod opreme i namještaja poput pultova, hladnjaka, štednjaka, sudopera, kupki itd.), praznina, servisnih kanala, prostora za lifte, cjevovoda...

Biocidni proizvod je posebno pogodan na osjetljivim površinama gdje je uporaba ubočajenih formulacija insekticida ograničena, npr. u blizini električne i elektroničke opreme itd. Tamo gdje je utvrđena imigracija žohara, postavljanje dodatnih mamaca u rubna područja lokacije pomoći će pri kontroli. Preporučuje se gel nanijeti izravno kao točkice/kapljice veličine 7 mm ili tanke vrpce na površine u identificiranim ciljnim područjima. Treba ga postaviti izvan vidokruga i tamo gdje je zaštićen od direktnog izvora svjetlosti. Gel se ne smije stavlјati na mesta na koja mogu doći djeca ili kućni ljubimci. Izbjegavati nanošenje na pretjerano prašnjava, vlažna ili masna mesta. Ne nanositi na površine koje mogu biti u doticaju s vodom ili gdje se provodi mokro čišćenje. Ne nanositi na površine koje su nedavno tretirane drugim insekticidima i ne kontaminirati mamac drugim insekticidima.

Učinak na populaciju žohara može se očekivati vrlo brzo s mrtvim žoharama vidljivima u roku od 24 sata nakon tretiranja (postavljanja mamca). Maksimalne razine kontrole postižu se između šest dana i dva mjeseca nakon tretiranja, ovisno o razini infestacije i sve dok je gel prisutan. Tamo gdje je infestacija velike, potrebno je redovito pregledati postavljeni mamac (jednom mjesечно) i nanijeti novu količinu gela ako je potrebno. Međutim, ne nanositi više od jednom mjesечно.

Za uporabu protiv sive srebrne ribice: Staviti mnogo malih kapljica na mesta gdje se sive srebrne ribice skrivaju i žive. Ta se mesta mogu nalaziti ispod/iza podnožja/lajnsi, ispod drvenih obloga ili drugih mesta koja pružaju zaklon.

Nije za održavanje.

Ne nanositi u torovima i kavezima za životinje.

Uklanjanje starih mamaca/mrlja od gela moraju obaviti profesionalni korisnici.

PRIJE UPORABE PROČITATI SVE MJERE OPREZA

OBAVIJESTITI NOSITELJA REGISTRACIJE, AKO JE TRETIRANJE BILO NEUČINKOVITO

NE NANOSITI PROIZVOD NA UPIJAJUĆE POVRŠINE

MAMAC NE IZLAGATI SUNCU ILI IZVORIMA TOPLINE

ZAŠTITITI OD KIŠE

5.2. Mjere za smanjenje rizika

• Izbjegavati nanošenje mamca na pretjerano prašnjava, vlažna ili masna mesta. Ne nanositi na površine koje mogu biti u doticaju s vodom ili gdje se provodi mokro čišćenje. Obratite posebnu pozornost na pukotine, rupe i druge ulazne točke koje obično koriste insekti, kao i područja iza ili ispod strojeva, opreme za kuhinju i kupaonicu ili cjevovoda. Proizvod se može staviti u praznine, servisne kanale, otvore za liftove, električnu i elektroničku opremu itd.

Nije namijenjeno za uporabu u stajama, torovima ili kavezima za životinje. Ne preporučuje se za uporabu u objektima s insektivornim pticama i gnezgovima.

- Čuvati izvan dohvata djece.
- Nosit odgovarajuće zaštitne rukavice kod primjene i rukovanja proizvodom.
- Izbjegavati kontakt s kožom.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon uporabe proizvoda i prije jela.
- NE KORISTITI na površinama, gdje bi moglo doći do kontaminacije hrane, hrane za životinje ili vode.
- Koristiti samo na mjestima nedostupnim djeci i životinjama.
- Ne smije se otvarati ili puniti spremnike.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Opći savjeti:

Ako se prolije značajna količina, primjenjivi su sljedeći savjeti. Napustiti kontaminirano područje. Unesrećenu osobu smjestiti u stabilan položaj (ležeći postrane). Odmah ukloniti kontaminiranu odjeću i sigurno ju odložiti. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke na etiketi.

UNESREĆENU OSOBU NIKADA NE OSTAVIT SAMU!

Kontakt s kožom: Temeljito oprati s dovoljno sapuna i vode, a zatim isprati s vodom. Ako dođe do iritacije/senzibilizacije kože, ili ona ne nestaje ili se pojača, potražite liječničku pomoć.

Kontakt s očima: Odmah isprati oči s puno mlake vode. Provjeriti i ukloniti kontaktne leće. Nastaviti ispirati najmanje 5 minuta.

Ako simptomi potraju, potražiti liječničku pomoć.

Gutanje: Nazvati centar za kontrolu otrovanja (za Hrvatsku: +385 (0)1 23 48 342) ili doktora. Isprati usta vodom. Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak i staviti ju u položaj ugodan za disanje. Ako je materijal progutan, a izložena osoba pri svijesti, treba joj isprati usta vodom. Odmah zatražiti pomoć liječnika.

Savjeti za medicinsko i zdravstveno osoblje:

Pružiti simptomatsko i podržavajuće liječenje.

IMATI AMBALAŽU ILI ETIKETU PRI RUCI I NAZOVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA [za Hrvatsku: +385 (0)1 23 48 342].

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Sadržaj/spremnik odložite u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.
- Neželjeni gel može se ukloniti kada je svježe nanesen korištenjem spužve s 5 % otopinom natrijevog klorida. Korištene sružve/maramice treba odložiti kao kruti otpad.
- Ostariji gel može se ukloniti lopaticama i odložiti kao kruti otpad.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Uvjeti skladištenja: Čuvati u originalnoj ambalaži. Zaštiti od smrzavanja. Čuvati na sigurnom mjestu.
Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. Ostale informacije

Proizvod može zaprljati neke osjetljive materijale kao npr. tekstil. U slučaju sumnje, prvo ga nanijeti na malo, neprimjetno mjesto. Potencijalna otpornost (rezistentnost) ciljnih insekata na klotianidin može biti zabrinjavajuća, stoga mjere upravljanja otpornošću trebaju biti uključene u odobrenje za proizvode. To može uključivati (ali ne bi trebalo biti ograničeno) sljedeće čimbenike:

- Moraju se uspostaviti dobri sanitarni postupci i sve druge mjere koje sprečavaju razvoj infestacije (tj. nekemijske mjere).
- Proizvode treba uvijek koristiti u skladu s preporukama s etikete, u pogledu doze koja se primjenjuje i intervala primjene. Mora se primijeniti učinkovita doza, ne više i ne manje od toga.
- Tretiranje treba izmjenjivati s proizvodima s različitim načinima djelovanja, tj. izbjegavajti rotiranje različitih neonikotinoida. Preporučljivo je izbjegavati upotrebu Maxforce Platina isključivo i kontinuirano kao jedino sredstvo za suzbijanje žohara. Maxforce Platin treba koristiti kao jednu komponentu integriranog programa za suzbijanje štetnika koji sadrži formulacije gela s različitim bazama hrane i proizvode iz alternativnih kemijskih klasa s različitim metodama primjene.
 - Treba nadzirati razine učinkovitosti (povremene provjere), a slučajeve smanjene učinkovitosti treba istražiti radi moguće pojave otpornosti, imajući na umu da sanitarni uvjeti i blizina neobrađenih refugija mogu pridonijeti riziku od ponovne infestacije.
 - U slučajevima kada pravilno primijenjene doze s etikete ne daju očekivanu razinu kontrole i dođe do pojave otpornosti (rezistentnosti), treba izbjegavati uporabu bilo kojeg proizvoda s istim načinom djelovanja, posebno neonikotinoida.
 - U slučaj pojave otpornosti (na što ukazuju ili neuspjesi u kontroli ili ispitivanja), tada treba poduzeti sve što je potrebno kako bi se populacija iskorijenila. Mjere potrebne za iskorjenjivanje varirat će u različitim situacijama; mogu uključivati brojne postupke koji koriste kemijske i nekemijske mjere.