



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/21-12/43

URBROJ: 534-03-3-2/3-22-3

Zagreb, 22. ožujka 2022.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija**, u predmetu obnove odobrenja za biocidni proizvod, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **IMIDASECT**.

II. Obnova odobrenja za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **14.12.2026.**

Obrazloženje

Trgovačko društvo **Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za obnovom odobrenja za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda **IMIDASECT**. Obnova odobrenja za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 14.12.2026. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države Njemačke. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. **Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija**
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

IMIDASECT

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih
člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/21-12/43

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0017413-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	IMIDASECT
-----------------	-----------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Sharda Europe B.V.B.A.
	Adresa	Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/21-12/43	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0017413-0000	
Datum odobrenja	22.3.2022.	
Datum isteka odobrenja	14.12.2026.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Španjolska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Imidakloprid
Naziv proizvođača	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD, 393 East Heping Road Shijizhang Kina

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna tvar	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. **Vrsta formulacije**
GD - Gel za izravnu primjenu

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI**

Oznaka upozorenja	H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH208 Sadrži 1,2 - benzizotiazol-3 (2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

4. **ODOBRENA UPORABA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Zatvoreni prostori, primjena u pukotinama i procjepima, smeđi žohar, profesionalna upotreba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Uobičajeno ime: Smeđi žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: Primjena u pukotinama i procjepima Detaljan opis: Primjena u pukotinama i procjepima
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.1 g/m ² ; visoka stopa zaraze 0.2 g/m ² . Jedna kap gela promjera 5 mm odgovara 0.1 g biocidnog proizvoda. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Maksimalno 6 primjena tijekom godine.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Patrona, Plastika (HDPE) , 30g; 35g, 50g, 100g

4.1.1. **Upute za uporabu specifične za uporabu**

- 1) Proizvod se može nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod sudopera, pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procjepima gdje se mogu skrivati žohari.
- 2) Kapljice mamaca ne izlagati sunčevom svjetlu ili izvoru topline (npr. radijator).
- 3) Ne nanositi na porozne površine. U slučaju da to nije moguće, nanosite proizvod na plastičnu ploču.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Zatvoreni prostori, primjena u pukotinama i procjepima, neprofesionalna upotreba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Uobičajeno ime: Smeđi žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Uobičajeno ime: Crni žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: Primjena u pukotinama i procjepima Detaljan opis: Primjena u pukotinama i procjepima
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.2 g/m ² ; visoka stopa zaraze 0.3 g/m ² . Jedna kap gela promjera 5 mm odgovara 0.1 g biocidnog proizvoda. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Maksimalno 6 primjena tijekom godine.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Šprica, plastična (HDPE), 3g, 5g, 10g, 15g

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- 1) Proizvod se može nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod sudopera, pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procjepima gdje se mogu skrivati žohari.
- 2) Ako se sumnja ili je uočen veliki broj žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) za visoku stopu zaraze. Ako je uočeno samo nekoliko ili pojedinačnih žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) za nisku stopu zaraze.
- 3) Kapljice mamaca ne izlagati sunčevom svjetlu ili izvoru topline (npr. radijator).
- 4) Ne nanositi na porozne površine. U slučaju da to nije moguće, nanosite proizvod na plastičnu ploču.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – Zatvoreni prostori, primjena u pukotinama i procjepima, crni žohar, profesionalna upotreba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Uobičajeno ime: Crni žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: Primjena u pukotinama i procjepima Detaljan opis: Primjena u pukotinama i procjepima
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.2 g/m ² ; visoka stopa zaraze 0.3 g/m ² . Jedna kap gela promjera 5 mm odgovara 0.1 g biocidnog proizvoda. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Maksimalno 6 primjena tijekom godine.

Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Patrona, Plastika (HDPE) , 30 g, 35 g, 50 g, 100 g

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- 1) Proizvod se može nanositi samo na ograničena područja na površinama koje se ne čiste redovito, na primjer iza ili ispod hladnjaka, ispod sudopera, pećnice ili bojlera, u svim pukotinama i procjepima gdje se mogu skrivati žohari.
- 2) Kapljice mamaca ne izlagati sunčevom svjetlu ili izvoru topline (npr. radiator).
- 3) Ne nanositi na porozne površine. U slučaju da to nije moguće, nanosite proizvod na plastičnu ploču.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte opće upute za uporabu

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Uporaba br. 4 – Zatvoreni prostori, klopke s mamcima

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Uobičajeno ime: Smeđi žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Uobičajeno ime: Crni žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: Klopke s mamcima Detaljan opis: Postavljanje klopki s mamcima
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Niska stopa zaraze 0.2g/m ² (klopka s 0.75g mamca na 4 m ² ; klopka s 1g mamca na 5m ² ; klopka s 1.2g mamca na 6 m ² , klopka s 1.4g mamca na 7 m ²). Visoka stopa zaraze 0.3g/m ² (klopka s 0.75g mamca na 2.5

	m2; klopka s 1g mamca na 3 m2; klopka s 1.2g mamca na 4 m2, klopka s 1.4g mamca na 5 m2). Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Maksimalno 6 primjena tijekom godine.
Kategorije korisnika	profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Klopka s mamcima, Plastika (HDPE) , 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ako se sumnja ili je uočen veliki broj žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) primjene za visoku stopu zaraze. Ako je uočeno samo nekoliko ili pojedinačnih žohara, primijeniti aplikaciju (dozu) primjene za nisku stopu zaraze.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- 1) Primjenjene klopke s mamcima trebaju biti otporne na manipuliranje.
- 2) Ne otvarati na silu klopku s mamcima.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Uporaba br. 5 – Na otvorenom, klopke s mamcima

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Uobičajeno ime: Smeđi žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Uobičajeno ime: Crni žohar Stadij razvoja: nimfe, odrasli

Područje primjene	na otvorenom Primjena na otvorenom kao barijera oko zgrada na potencijalnim mjestima ulaska žohara
Načini primjene	Metoda: Klopke s mamcima Detaljan opis: Postavljanje klopki s mamcima
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Ukupni opseg od 0.3 g/m (klopka s 0.75g mamca na 2.5 m; klopka s 1g mamca na 3 m; klopka s 1.2g mamca na 4 m, klopka s 1.4g mamca na 5m) Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Maksimalno 6 primjena tijekom godine.
Kategorije korisnika	profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Klopka s mamcima, Plastika (HDPE), 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Klopke s mamcima primijeniti samo na tvrdim površinama poput terasa i otvorenih dvorišta.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- 1) Primjenjene klopke s mamcima trebaju biti otporne na manipuliranje.
- 2) Ne otvarati na silu klopku s mamcem.
- 3) Nanesite samo na područjima koja nisu podložna potapanju ili vlaženju, tj. zaštićena od kiše, poplava i vode za čišćenje.
- 4) Nemojte koristiti proizvod tamo gdje se ne može spriječiti ispuštanje u odvode (kanalizaciju).

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte opće upute za uporabu

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte opće upute za uporabu

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte opće upute za uporabu

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

- 1) Pridržavajte se uputa za uporabu.
- 2) Prije primjene, ukloniti sve prirodne izvore hrane za žohare (otpad, ostatke hrane...) iz zaraženog područja kako bi se potaknuo unos gela.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- 3) Tijekom pregleda provjeriti tretirano područje i ako je potrebno, zamijeniti gel jer isti može biti prekriven izlučevinama i fekalijama žohara kako bi privukli iste vrste.
- 4) Proizvod se može koristiti kontinuirano 3 mjeseca bez zamjene klopke za mamac ili nepotrošenih mamaca.
- 5) Obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neučinkovita.
- 6) Kako bi se zaštitile ptice, kućni ljubimci i sisavci, uginule žohare potrebno je svakodnevno uklanjati s tretiranog područja.
- 7) Jednom tjedno provjeravajte klopke s mamcima.
- 8) Ako zaraza potraje unatoč poštivanju uputa na naljepnici, obratiti se profesionalnoj službi za dezinfekciju. Izbjegavajte kontinuiranu upotrebu proizvoda.
- 9) Na kraju tretmana sakupite klopke s mamcima za zbrinjavanje.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- 1) Čuvati izvan dohvata djece.
- 2) Postavite mamac izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne ciljanih životinja.
- 3) Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
- 4) Ne koristiti izravno na ili blizu hrane, hrane za životinje ili pića, niti na površinama ili priboru koji bi mogli biti u izravnom kontaktu s hranom, hranom za životinje, pićima i životinjama.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- 1) Ako je potreban liječnički savjet, imajte pri ruci spremnik ili etiketu proizvoda.
- 2) NAKON DODIRA S KOŽOM: Skinite svu kontaminiranu odjeću i operite ju prije ponovne upotrebe. Operite kožu vodom. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: potražite savjet liječnika.
- 3) NAKON DODIRA S OČIMA: Ako se pojave simptomi isperite vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 4) NAKON GUTANJA: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 5) NAKON UDISANJA: Nije primjenjivo.
- 6) Ovaj biocidni proizvod sadrži imidakloprid koji je opasan za pčele.

Za daljnje informacije u slučaju sumnje na otrovanje nazvati broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja: 01 23-48-342

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- 1) Nemojte ispuštati neiskorišteni proizvod na tlo, u vodotoke, u cijevi (umivaonik, WC...) niti u odvodne kanale.
- 2) Odložite neiskorišteni proizvod, njegovu ambalažu, klopke s mamcima i sav ostali otpad (npr. uginule kukce) u skladu s lokalnim propisima.
- 3) Ne čistiti klopku s mamcima prije odlaganja.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- 1) Ne skladištiti u blizini hrane, pića i stočne hrane. Čuvati izvan dohvata djece.
- 2) Rok trajanja: 24 mjeseca
- 3) Proizvod ne izlagati sunčevom svjetlu.

6. OSTALE INFORMACIJE

Proizvod sadrži gorku tvar.