

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Biopren ant gel

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülilalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Loa number: EE-0015756-0000

**Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande
viitenumber:** EE-0015756-0000

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	2
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	3
4. Lubatud kasutusala(d)	3
5. Üldised kasutamisharjutused	11
5.1. Kasutusjuhendid	11
5.2. Riskivähendamismeetmed	11
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	11
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	12
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	12
6. Muu teave	12

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

BIOPREN Ant Killer Gel / sipelgaid surmav geel
Protect Ant Killer Gel / sipelgaid surmav geel
BIOPREN Ant Gel / sipelgageel
Protect Ant Gel / sipelgageel

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
	Aadress	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Ungari
Loa number	EE-0015756-0000	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0015756-0000	
Loa andmise kuupäev	15/09/2021	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	05/08/2026	

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Mylva S.A.
Tootja aadress	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Sant Galderic 23 08395 Sant Pol de Mar Hispaania

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	37 - Imidaklopriid
Tootja nimi	ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.
Tootja aadress	Príncipe de Vergara 110-5ª 28002 Madrid Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Iisrael
	Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou Hiina

Toimeaine	1386 - S-metopreen
Tootja nimi	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
Tootja aadress	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ungari
Tootmiskohtade asukoht	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ungari

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Imidaklopriid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Toimeaine	138261-41-3	428-040-8	0,01
S-metopreen	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Toimeaine	65733-16-6		0,08

2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.

Vältida sattumist keskkonda.

Mahavoolanud toode kokku koguda.

Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada kui ohtlik jääde registreeritud asutuse või ettevõtte poolt vastavalt kehtivale seadusandlusele (kahjulike organismide tõrjuja).

Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada kui ohtlik jääde vastavalt kehtivale seadusandlusele (kutseline kasutaja ja tavatarbija).

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - # 1 – Tilkade/joontena kasutatav mürksöödageel – Siseruumides – Kahjulike organismide tõrjuja, kutseline kasutaja, tavatarbija

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Insektitsiid sipelgate tõrjeks.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Linepithema humile
Tavanimetus: Argentiina sipelgas
Arengustaadium: Täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Lasius niger
Tavanimetus: Must sipelgas
Arengustaadium: Täiskasvanud

Kasutuskoh

Sisetingimustes

Siseruumides. Elu- ja tööstushoonetes, avalikes ja kaubanduslikes hoonetes või asutustes. Biotsiidi kanda piiratud alal mööbli ja masinate taha koht-töötlemisena.

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:

Koht-töötlemine mürksöödaga süstla/tuubi abil.
Kanda BIOPREN Ant Killer Geeli tilkade või joontena (piklike tilkadena) sipelgate asukohtadesse.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 0.2-0.6 g/m²
Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:
Kasutusmäär: 0.2-0.6 g/m² = 1-3 tilka/m²
(1 tilk = üks 3 cm pikkune joon = 0.2g mürksöödageeli)
Kasutamise sagedus: Kontrollida kohta 7 päeva pärast. Kui mürksööt on kadunud ja saastatus jätkub, kanda üks kord uuesti.

Kasutamiskordade sagedus: Kolm kuud peale saaste kadumist võib uuesti kasutada. Maksimaalselt 8 kasutusperioodi aastas.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Kutseline kasutaja

Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Tavatarbija :
LDPE süstal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ja 45 mürksöödageeliga.
kutseline kasutaja:

LDPE süstal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 mürksöödageeliga.

Kahjulike organismide tõrjuja:
LDPE tuub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ja 500 gmürksöödageeliga.
LDPE süstal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 g mürksöödageeliga.

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutada vaid siseruumides.

Biotsiidi kanda piiratud alal mööbli ja masinate taha koht-töötlemisena.

Enne mürksööda kasutamist on soovitatav käed pesta, et vältida mürksööda saastamist tugevate lõhnadega nagu tubakas jne.

BIOPREN Ant Killer geeli kasutamispirkondade lähedal mitte kasutada kemikaale pihuse või auruna, kuna need võivad mürksööta saastada ning muuta selle sipelgatele mitteatraktiivseks.

Mitte kasutada poorsetel pindadel. Kui seda pole võimalik vältida, kanda toodet plastalusele.

Mitte kasutada alal, kus on hiljuti kasutatud mõnda teist insektitsiidi.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. Üldised kasutamisharjutused p.5.3.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. Üldised kasutamisharjutused p.5.4.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. Üldised kasutamisharjutused p.5.5.

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - # 2 – Tilkade/joontena kasutatav mürksöödageel – Kasutamine väliskeskkonnas-Kahjulike organismide tõrjuja

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Insektitsiid sipelgate tõrjeks.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Linepithema humile
Tavanimetus: Argentiina sipelgas
Arengustaadium: Täiskasvanud

Kasutuskoh

Välitingimustes

Väliskeskkonnas sillutatud pindadel

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:

Koht-töötlemine mürksöödaga süstla/tuubi abil.
Kanda BIOPREN Ant Killer Geeli tilkade või joontena (piklike tilkadena) sipelgate asukohtadesse.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 0.2-0.6 g/m²
Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:
Kasutusmäär: 0.2-0.6 g/m² = 1-3 tilka/m²
(1 tilk = üks 3 cm pikkune joon = 0.2g mürksöödageeli)
Kasutamise sagedus: Kontrollida kohta 7 päeva pärast. Kui mürksööt on kadunud ja saastatus jätkub, kanda üks kord uuesti.
Kasutamiskordade sagedus: Kolm kuud peale saaste kadumist võib uuesti kasutada. Maksimaalselt 8 kasutusperioodi aastas.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

LDPE tuub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ja 500 g mürksöödageeliga.

LDPE süstal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 g mürksöödageeliga.

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kasutada ainult sillutatud pindadel.

Enne mürksööda kasutamist on soovitatv käed ära pesta, et vältida mürksööda saastamist tugevate lõhnadega nagu tubakas jne.

BIOPREN Ant Killer geeli kasutamiskiirkondade lähedal ei või kasutada kemikaale pihuse või auruna, kuna need võivad mürksööta saastada ja muuta selle sipelgatele mitteatraktiivseks.

Mitte kasutada poorsetel pindadel. Kasutada vaid sillutatud pindadel. Kui seda pole võimalik vältida, kanda toodet plastalusele.

Mitte kasutada aladel, kus on hiljuti kasutatud mõnda teist insektitsiidi.

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.
Vältida toote otsest kokkupuudet mesilaste ja teiste tolmeldajatega kattes toote näiteks lillepotiga või katusekiviga (kindlustades siiski, et sipelgad saavad mürksöödale ligi).

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. Üldised kasutamisyhised p.5.3.

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. Üldised kasutamisyhised p.5.4.

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. Üldised kasutamisyhised p.5.5.

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - # 3 – Lõksudena (mürksöödamajades) kasutatav mürksöödageel - Siseruumides – Kahjulike organismide tõrjuja, kutseline kasutaja, tavatarbija

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Insektitsiid sipelgate tõrjeks.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Linepithema humile
Tavanimetus: Argentiina sipelgas
Arengustaadium: Täiskasvanud

Teaduslik nimetus: Lasius niger
Tavanimetus: Must sipelgas
Arengustaadium: Täiskasvanud

Kasutuskoh

Sisetingimustes

Siseruumides. Elu- ja tööstushoonetes, avalikes ja kaubanduslikes hoonetes või asutustes.

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:
Kasutusvalmis mürksöödamaja.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 0.3-0.6 g/m²
Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:
Kasutusmäär: 0.3-0.6 g/m² sõltuvalt saastatuse ulatusest, parema tulemuse saamiseks eelistatult jaotada erinevate mürksöödamajade vahel.
Näiteks asetada 2 kuni 3 mürksöödamaja (kokku 5-15g mürksööta) 25 m² kohta.
Kasutamise sagedus: Kontrollida kohti 7 päeva pärast ja asetada uus mürksöödamaja, kui mürksööt on kadunud ja saastatus on alles.
Kasutamiskordade sagedus: Kolm kuud peale saaste kadumist võib uuesti kasutada.
Maksimaalselt 8 kasutusperioodi aastas.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Kutseline kasutaja
Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Tavatarbija ja kutseline kasutaja:
Plastist mürksöödamajad /kapsel 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 g mürksöödageeliga.

Kahjulike organismide tõrjuja:
Plastist mürksöödamajad /kapsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 30 ja 60 g mürksöödageeliga.

4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Mürksöödageel läbipaistvas lõksus (mürksöödamajas).
Asetada mürksöödamajad (siseruumides) kohtadesse, kus on sipelgaid ja eriti nende radade ja pesade lähedusse.

Kontrollida kohti ja asetada uus mürksöödamaja, kui mürksööt on kadunud ja saastatus on alles.

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Mürksöödamaja ei tohi avada ega lahti muukida.
Mitte kunagi ei tohi sõrmi mürksöödamaja avaustest sisse panna.
Töötlemise lõppemisel kõrvaldada mürksöödamajad.

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. Üldised kasutamishüvisid p.5.3.

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. Üldised kasutamishüvisid p.5.4.

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. Üldised kasutamishüvisid p.5.5.

4.4 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 4 - # 4 – Lõksudena (mürksöödamajades) kasutatav mürksöödageel – Kasutamine väliskeskkonnas – Kahjulike organismide tõrjuja

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalagsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Insektitsiid sipelgate tõrjeks.

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Linepithema humile
Tavanimetus: Argentiina sipelgas
Arengustaadium: Täiskasvanud

Kasutuskoh

Välitingimustes

Väliskeskkonnas (hoonete, terrasside,... ümbruses): sipelgaradade ja -pesade läheduses sillutatud pindadel.

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kasutamine söödana
Üksikasjalik kirjeldus:
Kasutusvalmis söödajad.

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: 0.2-0.6 g/m²
Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:
Kasutusmäär: 0.2-0.6 g/m², sõltuvalt saastatuse ulatusest, parema tulemuse saamiseks eelistatult jaotada erinevate mürksöödamajade vahel.
Näiteks asetada 2 kuni 3 mürksöödamaja (kokku 5-15g sööta) 25 m² kohta.
Kasutamise sagedus: Kontrollida kohti 7 päeva pärast ja asetada uus mürksöödamaja, kui mürksööd on kadunud ja saastatus on alles.
Kasutamiskordade sagedus: Kolm kuud peale saaste kadumist võib uuesti kasutada.
Maksimaalselt 8 kasutusperioodi aastas.

Kasutajarühm(ad)

Väljaõppe saanud kutseline kasutaja

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Kahjulike organismide tõrjuja:

Plastist mürksöödamajad /kapsel 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 ja 30 g mürksöödageeliga.

4.4.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Mürksöödageel läbipaistvas lõksus (mürksöödamajas).

Asetada mürksöödamajad (väliskeskkonnas) kohtadesse, kus on sipelgaid, eriti nende radade ja pesade lähedusse.

Asetada mürksöödamajad vaid sillutatud pindadele ja kohtadesse, mis on vihma eest kaitstud, et vältida toote sattumist keskkonda ning kaitstuna otsese päikese eest.

Väliskeskkonnas (terrassil, siseöues, tagahoovis või aias) asetada BIOPREN Ant Killer geel kohtadesse, kus sipelgate esinemise tõenäosus on suur.

Kontrollida kohti ja asetada uus mürksöödamaja, kui mürksööt on kadunud ja saastatus on alles.

4.4.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Mürksöödamaja ei tohi avada ega lahti muukida.

Mitte kunagi ei tohi sõrmi mürksöödamaja avaustest sisse panna.

Töötlemise lõppemisel kõrvaldada mürksöödamajad.

Kaitsta mürksöödamaja vihma eest. Asetada mürksöödamajad vaid kohtadesse, mis on vihma eest kaitstud, et vältida toote sattumist keskkonda.

4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. Üldised kasutamishüüdnäidised p.5.3.

4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. Üldised kasutamishühisid p.5.4.

4.4.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. Üldised kasutamishühisid p.5.5.

5. Üldised kasutamishühisid

5.1. Kasutusjuhendid

Lugeda alati toote etiketti või infolehte ja järgida seal toodud juhiseid.
Peale põhjalikku saastepiirkonna kontrolli, määramaks saastatus (kõrge või madal), paigaldada lõksud kohtadesse, kus sipelgaid täheldati.
Eemaldada muud alternatiivsed toiduallikad, mis võivad piirkonnas tootele konkurentsi pakkuda.
Toote tõhususeks on täiskasvanud sipelgate letaalsus üle 90% 15 päeva jooksul.
Biotsiid sisaldab imidaklorpiidi, mis on mesilastele ohtlik.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Hoida eemal kuumusest, lahtisest tulest ja sädemetest.
Mitte segada teiste kemikaalidega.
Mitte kasutada puidul ja poorsetel pindadel.
Vältida kontakti tootega töödeldud pindadega.
Toodet tuleks kasutada vaheldumisi teiste toodetega, millel on erinev toimeaine, et vältida resistentsse populatsiooni tekkimist.
Toodet tuleb taas peale kanda vaid seni, kuni saaste on kontrolli all.
Kasutada toodet soovitatud kasutusmääral ja sagedusel.
Kasutada vaid piirkondades, kuhu lapsed ja loomad ligi ei pääse.
Mitte kasutada otse toidu, joogi või sööda läheduses või pindadel ja tööriistadel, mis võivad olla otseses kontaktis toidu, joogi, sööda või kariloomadega.

Kahjulike organismide tõrjujad:

- Kohaldada kahjuritõrje integreeritud meetodeid nagu näiteks kombinatsioon keemilistest ja füüsikalistest kontrollimeetmetest ja teistest rahvatervise meetmetest, võttes arvesse kohalikke eripärasid (kliima, kahjuri sihtliik, kasutustingimused jne).
- Mitte kasutada toodet piirkondades, kus kahtlustatakse või on kindlaks määratud resistentsus toote toimeaine(te) suhtes.

Kutseline kasutaja ja tavatarbija:

- Teavitada loaomanikku kui toode ei ole tõhus.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Põhilised esmaabivõtted:

- ALLANEELAMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel, võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel, võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- SILMA SATTUMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel, loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Sümptomite ilmnemisel, võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Meditsiinilised soovitusused arstidele ja hoolduspersonalile:

- Sümpatomaatiline ja toetav ravi

MEDITSIINILISE KONSULTATSIOONI VAJADUSE KORRAL HOIDA TOOTE ETIKETT VÕI PAKEND KÄEPÄRAST JA VÕTTA ÜHENDUST MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA: 16662.

Hädaabimeetmed keskkonna kaitsmiseks:

Ettevaatusabinõud: Vältida sattumist äravoolu, pinna- ja põhjavette ning pinnasesse.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Kahjulike organismide tõrjujad:

Tühjad mahutid, kasutamata toode ja muud tõrje läbiviimisel tekkinud jäätmed on ohtlikud jäätmed. Viia need registreeritud jäätmeasutusse või –ettevõttesse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Märgistada jäätmed vastavalt jäätmeseadusele.

Mitte lasta pinnasesse, maha, pinnavette või kanalisatsiooni.

Kutseline kasutaja ja tavatarbija:

Tühjad mahutid, kasutamata toode ja muud tõrje läbiviimisel tekkinud jäätmed on ohtlikud jäätmed. Kõrvaldada need käibelt vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Mitte lasta pinnasesse, maha, pinnavette või kanalisatsiooni.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Originaalpakendis ja normaalsetes hoiutingimustes püsib toode stabiilsena 4 aastat.

Kaitsta külmumise eest.

Hoiustada originaalpakendis tihedalt suletuna.

Hoida kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas.

Soovitav on toodet hoida temperatuuril 5°C kuni 45°C.

Hoida valguse eest kaitstult.

Hoida lastele ja mitesihthloomade/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

6. Muu teave

Toode sisaldab mõruainet, mis muudab selle inimestele ja loomadele ebameeldivaks.
Taotleja peab oleme kindel, et tavatarbija teeb erinevatel putukaliikidel vahet ning suudab aru saada saaste ulatusest, et valida õige kasutusmäär.
Tilkades peab olema 0.2g sööta. Taotleja peab toote etiketil ära näitama 0.2g toodet sisaldava tilga suuruse.
Etiketil tuleb ära näidata vastavalt toote sisaldus ühe mürksöödamaja kohta. Nt. $0.2\text{g}/\text{m}^2 = 1$ mürksöödamaja, milles on 5g toodet 25m^2 kohta.
Eesti Mürgistusteabekeskus: 16662

Ainult kahjulike organismide tõrjujale:

Kasutaja peab teada andma, kui tõrje ei olnud tõhus ja andma loaomanikule kohe teada igast ohusignaalist, mida võib pidada resistentsuse tekkimise ilminguks.