

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

Názov skupiny výrobkov: Christeyns' Propan-1/2-ol BPF

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Číslo autorizácie: SK23-012-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0028978-0000

Obsah

Časť I. - Prvá úroveň informácií	1
1. Administratívne informácie	1
2. Zloženie a úprava skupiny výrobkov	4
Časť II. - Druhá úroveň informácií - meta SPC	4
1. Administratívne informácie o meta SPC - Meta SPC 1: Mida San 335 RV	5
2. Zloženie v rámci meta SPC	5
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC	5
4. Autorizované použitia podľa meta SPC	6
5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC	16
6. Ďalšie informácie	17
7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC	17
1. Administratívne informácie o meta SPC - Meta SPC 2: Mida San 334 MF	18
2. Zloženie v rámci meta SPC	18
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC	19
4. Autorizované použitia podľa meta SPC	19
5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC	29
6. Ďalšie informácie	30
7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC	30
1. Administratívne informácie o meta SPC - Meta SPC 3: Mida San 311 KZ	31
2. Zloženie v rámci meta SPC	31
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC	32
4. Autorizované použitia podľa meta SPC	32
5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC	45
6. Ďalšie informácie	46
7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC	46
1. Administratívne informácie o meta SPC - Meta SPC 4: Mida San 311 KZ wipes - Saniwipe	47
2. Zloženie v rámci meta SPC	47
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC	47

4. Autorizované použitia podľa meta SPC	48
5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC	52
6. Ďalšie informácie	53
7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC	53

Časť I. - Prvá úroveň informácií

1. Administratívne informácie

1.1. Názov skupiny výrobkov

Christeyns' Propan-1/2-ol BPF

1.2. Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

1.3. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno	Christeyns NV
Adresa	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgicko

Číslo autorizácie

SK23-012-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

SK-0028978-0000

Dátum autorizácie

10/07/2023

Dátum skončenia platnosti autorizácie

25/12/2031

1.4. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

Christeyns N.V.

Adresa výrobcu

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgicko

Miesto výrobných priestorov

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgicko

Meno/Názov výrobcu	Christeyns s.r.o.
Adresa výrobcu	Vitovska 453/7 742 35 Odry Česká republika
Miesto výrobných priestorov	Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Česká republika

Meno/Názov výrobcu	Christeyns Food Hygiene sas
Adresa výrobcu	ZA Les Farges 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	ZA Les Farges 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Francúzsko

Meno/Názov výrobcu	Betelgeux sl
Adresa výrobcu	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španielsko
Miesto výrobných priestorov	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španielsko

Meno/Názov výrobcu	Christeyns France sa
Adresa výrobcu	Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44120 Vertou Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44124 Vertou Francúzsko

Meno/Názov výrobcu	Christeyns Professional Hygiene srl.
Adresa výrobcu	Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Taliansko

Meno/Názov výrobcu	Christeyns UK Ltd.
Adresa výrobcu	Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené kráľovstvo
Miesto výrobných priestorov	Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené kráľovstvo

Meno/Názov výrobcu	Christeyns Food Hygiene Ltd.
Adresa výrobcu	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené kráľovstvo
Miesto výrobných priestorov	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené kráľovstvo

Meno/Názov výrobcu	Clover Chemicals Ltd.
Adresa výrobcu	Clover House, Macclesfield Road, Whaley Bridge SK23 7DQ High Peak Spojené kráľovstvo
Miesto výrobných priestorov	Clover House, Macclesfield Road, Whaley Bridge SK23 7DQ High Peak Spojené kráľovstvo

1.5. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1354 - propán-1-ol
Meno/Názov výrobcu	OQ Chemicals GmbH (Formerly OXEA GmbH)
Adresa výrobcu	Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Oxea corporation. 2001 FM 3057 TX 77404 Bay City Spojené štáty americké

Účinná látka	1355 - propán-2-ol
Meno/Názov výrobcu	Brenntag GmbH
Adresa výrobcu	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Shell Nederland Raffinaderij BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Holandsko
	Exxon Mobil, 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge 70805 LA Spojené štáty americké

Účinná látka	1354 - propán-1-ol
Meno/Názov výrobcu	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Adresa výrobcu	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine streeed 2090 Sandton Južná Afrika
Účinná látka	1355 - propán-2-ol
Meno/Názov výrobcu	Alcoholes Montplet S.A.
Adresa výrobcu	NOVAPEX, NOVACAP, Le Carré Joannès, 29 avenue Joannès Masset CS 10619 69258 Lyon Cedex 09 Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	NOVAPEX, Rue Gaston Monmousseau 38150 Salaise-sur-Sanne Francúzsko

2. Zloženie a úprava skupiny výrobkov

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	24,54 - 49,07
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	9,77 - 19,54

2.2. Typ(y) úpravy

AL - Iné tekutiny

Časť II. - Druhá úroveň informácií - meta SPC

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta SPC 1: Mida San 335 RV

1.2. Prípona čísla autorizácie

1-1

1.3 Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení v rámci meta SPC

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	24,54 - 24,54
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	9,77 - 9,77

2.2. Typ(y) úpravy v rámci meta SPC

Úprava/úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Uchovávajúte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

Zabráňte vdychovaniu pár.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Noste ochranné okuliare.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Uchovávajúte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Použitie 1 - Výrobky typu 02 Dezinfekcia povrchov, rozprašovanie pomocou pákového rozprašovača

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia.
Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov pomocou pákového rozprašovača po predchádzajúcom vyčistení.

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom Detailný opis: Pomocou pákového rozprašovača. Po rozprašení pákovým rozprašovačom a dosiahnutí požadovaného času kontaktu sa výrobok môže utrieť papierovou alebo textilnou utierkou.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 30 ml/m ² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Aplikačná dávka: 30 ml/m ² . Frekvencia: 1 aplikácia za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	1 l fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE) 5, 10, 22, 25 l doplnovacie kanistre (HDPE)

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³) a malé miestnosti (10 m³):

Max. 1 aplikácia za deň.

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 9 hodín od ošetrenia.

Farmaceutické a kozmetické výrobné prevádzky:

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je povinné počas miešania a plnenia. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Použitie 2 - Výrobky typu 02 Dezinfekcia povrchov, nízkotlakové rozprašovanie

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia.
Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov nízkotlakovým rozprašovaním po predchádzajúcom vyčistení.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Nízkotlakové rozprašovanie

Detailný opis:

Nízkotlakové rozprašovanie: po nízkotlakovom rozprašení sa výrobok nechá vyschnúť, ale neutiera sa.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 200 ml/m²

Riedenie (%): 0 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

	Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Aplikčná dávka: 200 ml/m ² . Frekvencia: 1 aplikácia za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné
Veľkosti balenia a obalový materiál	5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE) 1000 l IBC (HDPE)

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.
 Počas manipulácie s výrobkom je povinné používanie ochrany zraku (celotvárovej masky).
 Noste ochrannú kombinézu, ktorá je nepriepustná pre biocídny výrobok.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 8 m².
 Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
 Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené osoby.
 Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Malé miestnosti (10 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 4 m².
 Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
 Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené osoby.
 Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Čisté priestory:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².
 Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
 Počas aplikácie je potrebné vetranie s rýchlosťou výmeny 20/h.
 Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené osoby.
 Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Laboratóriá a biotechnológie:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrovaní miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Farmaceutické a kozmetické výrobné prevádzky:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrovaní miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Použitie 3 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia povrchov, rozprašovanie pomocou pákového rozprašovača

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Spôsob(y) aplikácie	<p>Vnútorne</p> <p>Vnútorne priestory. Veľkoplošné kuchyne, reštaurácie, potravinársky priemysel: Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov pomocou pákového rozprašovača po predchádzajúcom vyčistení.</p> <p>Spôsob: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom Detailný opis: Pomocou pákového rozprašovača: po rozprášení pákovým rozprašovačom a dosiahnutí požadovaného času kontaktu sa výrobok môže utrieť papierovou alebo textilnou utierkou.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 30 ml/m² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Aplikačná dávka: 30 ml/m². Frekvencia: 1 aplikácia za deň.</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	<p>Priemyselné</p> <p>Profesionálne</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>1 l fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE) 5, 10, 22, 25 l doplnovacie kanistre (HDPE)</p>

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³) a malé miestnosti (10 m³):

Max. 1 aplikácia za deň.

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu, s prilbou/kapučňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 9 hodín od ošetrenia.

Kuchyne a jedálne:

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je povinné počas miešania a plnenia. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4 Opis použitia

Použitie 4 - Použitie 4 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia povrchov, nízkotlakové rozprašovanie

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	nerelevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne priestory - vo veľkoplošných kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov nízkotlakovým postriekaním po predchádzajúcom vyčistení.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Nízkotlakové rozprašovanie Detailný opis: Nízkotlakové rozprašovanie: po nízkotlakovom rozprášení sa výrobok nechá vyschnúť, ale neutiera sa.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 200 ml/m²
Riedenie (%): 0 %
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Účinný proti baktériám a kvasinkám:
Pripravené na použitie.
Pri izbovej teplote.
Kontaktný čas 5 minút.
Aplikačná dávka: 200 ml/m².
Frekvencia: 1 aplikácia za deň.

Kategória(ie) používateľov

Priemyselné

Veľkosti balenia a obalový materiál

5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE)
1000 l IBC (HDPE)

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.
Počas manipulácie s výrobkom je povinné používanie ochrany zraku (celotvárovej masky).
Noste ochrannú kombinézu, ktorá je nepriepustná pre biocídny výrobok.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 8 m².
Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynú 12 hodín od ošetrenia.

Malé miestnosti (10 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 4 m².
Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynú 12 hodín od ošetrenia.

Inštitucionálne kuchyne a jedálne:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².
Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Priemyselné kuchyne:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Priemyselné výrobné priestory:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5 Opis použitia

Použitie 5 - Použitie 5 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia predmetov namáčaním

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	nerelevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne priestory – vo veľkoplošných kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov (predmetov) namáčaním po predchádzajúcom vyčistení.

Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: Namáčanie Detailný opis:</p> <p>Dezinfekcia nástrojov a vybavenia namáčaním (vkladaním predmetov do vopred naplnenej nádoby kúpeľa) alebo naplnením (naplnením prázdnej nádoby kúpeľa, ktorá už obsahuje predmety). V oboch prípadoch sú predmety úplne ponorené.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 25 litrov Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Frekvencia: 1 aplikácia za deň.</p>
Kategória(ie) používateľov	<p>Priemyselné Profesionálne</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE) 1000 l IBC (HDPE)</p>

4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Výrobok sa dá bezpečne spláchnuť do komunálnej kanalizácie napojenej na čistiareň odpadových vôd.

4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

- Dezinfekčné postupy sprejovaním, utieraním alebo namáčaním:

Všetky povrchy, ktoré sa majú dezinfikovať, je potrebné pred dezinfekčným postupom vyčistiť/opláchnuť/vysušiť: používateľ by mal dôkladne vyčistiť, opláchnuť a vysušiť čistiace kvapaliny z povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať.

- Dezinfekčný cyklus:

Všetky výrobky musia byť použité NEZRIEDENÉ.

Pozrite opis aplikačnej metódy súvisiacej s každým použitím, aby ste vedeli presný požadovaný ČAS KONTAKTU a to, či je po dezinfekcii potrebné ZÁVEREČNÉ OPLÁCHNUTIE (pitnou vodou).

- Pre dezinfekčné postupy pomocou pákového rozprašovača: Zabezpečte úplné namočenie povrchov, nechajte účinkovať počas určeného času kontaktu.

- Dezinfekčné postupy prostredníctvom namáčania: Kúpeľ nie je určený na opätovné použitie. Kúpeľ používajte len raz denne po práci a denne ho vymieňajte za čerstvý roztok.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Pred vstupom do ošetrovaných priestorov zabezpečte adekvátne vetranie.

Nepoužívajte v priestoroch prístupných širokej verejnosti.

Zabráňte kontaktu s očami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Všeobecné opatrenia prvej pomoci: Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu výrobku).

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak ťažkosti s dýchaním pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní najmenej 15 minút. Volajte 112/záchranú službu kvôli lekárskej pomoci.

PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je postihnutá osoba schopná prehĺtať. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchranú službu kvôli lekárskej pomoci.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené.

Príznaky/poranenia: Podráždenie dýchacích ciest a iných sliznicových membrán. Riziko vážneho poškodenia očí. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: Rýchle konanie je veľmi dôležité.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo verejných vôd, oznámte to úradom.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo povrchových vôd, oznámte to úradom.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Technické opatrenia:

Je potrebné dodržať správne uzemňovacie postupy, aby sa zabránilo vzniku statickej elektriny.

Skladovacie podmienky:

Uchovávať len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

Zabráňte vysokým teplotám.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Chráňte pred mrazom.

Nekompatibilné výrobky: Silné kyseliny. Silné zásady.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. Ďalšie informácie

Výrobok obsahuje propán-2-ol, pre ktorý bola dohodnutá akceptovateľná expozičná koncentrácia pri inhalácii pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC

7.1 Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

MIDA SAN 335 RV

Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

SK-0028978-0001 1-1

(Referenčné číslo záznamu v R4BP 3 - Vnútroštátna autorizácia)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	24,54
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	9,77

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta SPC 2: Mida San 334 MF

1.2. Prípona čísla autorizácie

1-2

1.3 Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení v rámci meta SPC

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	34,35 - 34,35
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	13,68 - 13,68

2.2. Typ(y) úpravy v rámci meta SPC

Úprava/úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

Zabráňte vdychovaniu pár.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Noste ochranné okuliare.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Použitie 1 – Výrobky typu 02 Dezinfekcia povrchov, rozprašovanie pomocou pákového rozprašovača

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia: Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov pomocou pákového rozprašovača po predchádzajúcom vyčistení.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom

Detailný opis:

Pomocou pákového rozprašovača: po rozprášení pákovým rozprašovačom a dosiahnutí požadovaného času kontaktu sa výrobok môže utrieť papierovou alebo textilnou utierkou.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 30 ml/m²

Riedenie (%): 0 %

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Účinný proti baktériám a kvasinkám:

Pripravené na použitie.

Pri izbovej teplote.

Kontaktný čas 5 minút.

Aplikačná dávka: 30 ml/m².

Frekvencia: 1 aplikácia za deň.

Kategória(ie) používateľ'ov

Priemyselné

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

1 l fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE)
5, 10, 22, 25 l doplnňovacie kanistre (HDPE)

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.
Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³) a malé miestnosti (10 m³):

Max. 1 aplikácia za deň.

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 9 hodín od ošetrenia.

Farmaceutické a kozmetické výrobné prevádzky:

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je povinné počas miešania a plnenia. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Použitie 2 – Výrobky typu 02 Dezinfekcia povrchov, nízkotlakové rozprašovanie

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov nízkotlakovým rozprašovaním po predchádzajúcom vyčistení.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Nízkotlakové rozprašovanie Detailný opis: Nízkotlakovým rozprašovaním: po nízkotlakovom rozprašení sa výrobok nechá vyschnúť, ale neutiera sa.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 200 ml/m ² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Aplikačná dávka: 200 ml/m ² . Frekvencia: 1 aplikácia za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné
Veľkosti balenia a obalový materiál	5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE) 1000 l IBC (HDPE)

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas manipulácie s výrobkom je povinné používanie ochrany zraku (celotvárovej masky).

Noste ochrannú kombinézu, ktorá je nepriepustná pre biocídny výrobok.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 8 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapučňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené neúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynú 12 hodín od ošetrenia.

Malé miestnosti (10 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 4 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný

respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Čisté priestory:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie je potrebné vetranie s rýchlosťou výmeny 20/h.

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Laboratóriá a biotechnológie:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Farmaceutické a kozmetické výrobné prevádzky:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Použitie 3 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia povrchov, rozprašovanie pomocou pákového rozprašovača

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>Vnútorne priestory – Vo veľkoplošných kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov pomocou pákového rozprašovača po predchádzajúcom vyčistení.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom Detailný opis: Pomocou pákového rozprašovača: po rozprášení pákovým rozprašovačom a dosiahnutí požadovaného času kontaktu sa výrobok môže utrieť papierovou alebo textilnou utierkou.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 30 ml/m² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Aplikačná dávka: 30 ml/m². Frekvencia: 1 aplikácia za deň.</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	<p>Priemyselné</p> <p>Profesionálne</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>1 l fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE) 5, 10, 22, 25 l doplnovacie kanistre (HDPE)</p>

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³) a malé miestnosti (10 m³):

Max. 1 aplikácia za deň.

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 9 hodín od ošetrenia.

Kuchyne a jedálne:

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je povinné počas miešania a plnenia. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4 Opis použitia**Použitie 4 - Použitie 4 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia povrchov, nízkotlakové rozprašovanie****Typ výrobku**

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: dospelé jedince

Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne priestory – Vo veľkoplošných kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov nízkotlakovým rozprašovaním po predchádzajúcom vyčistení.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Nízkotlakové rozprašovanie Detailný opis: Nízkotlakovým rozprašovaním: po nízkotlakovom rozprašení sa výrobok nechá vyschnúť, ale neutiera sa.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 200 ml/m ² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Aplikačná dávka: 200 ml/m ² . Frekvencia: 1 aplikácia za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné
Veľkosti balenia a obalový materiál	5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE) 1000 l IBC (HDPE)

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas manipulácie s výrobkom je povinné používanie ochrany zraku (celotvárovej masky).

Noste ochrannú kombinézu, ktorá je nepriepustná pre biocídny výrobok.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 8 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Malé miestnosti (10 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 4 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Inštitucionálne kuchyne a jedálne:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Priemyselné kuchyne:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Priemyselné výrobné priestory:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5 Opis použitia

Použitie 5 - Použitie 5 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia predmetov namáčaním

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky

	Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne priestory – Vo veľkoplošných kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov (predmetov) namáčaním po predchádzajúcom vyčistení.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Namáčanie Detailný opis: Dezinfekcia nástrojov a vybavenia namáčaním (vkladaním predmetov do vopred naplnenej nádoby kúpeľa) alebo naplnením (naplnením prázdnej nádoby kúpeľa, ktorá už obsahuje predmety). V oboch prípadoch sú predmety úplne ponorené.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 25 litrov Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Účinný proti baktériám a kvasinkám: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Kontaktný čas 5 minút. Frekvencia: 1 aplikácia za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE) 1000 l IBC (HDPE)

4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Výrobok sa dá bezpečne spláchnuť do komunálnej kanalizácie napojenej na čistiareň odpadových vôd.

4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

- Dezinfekčné postupy rozprašovaním, utieraním alebo namáčaním :

Všetky povrchy, ktoré sa majú dezinfikovať, je potrebné pred dezinfekčným postupom vyčistiť/opláchnuť/vysušiť: používateľ by mal dôkladne vyčistiť, opláchnuť a vysušiť čistiace kvapaliny z povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať.

- Dezinfekčný cyklus:

Všetky výrobky musia byť použité NEZRIEDENÉ.

Pozrite opis aplikačnej metódy súvisiacej s každým použitím, aby ste vedeli presný požadovaný ČAS KONTAKTU a to, či je po dezinfekcii potrebné ZÁVEREČNÉ OPLÁCHNUTIE (pitnou vodou).

- Pre dezinfekčné postupy pomocou pákového rozprašovača : Zabezpečte úplné namočenie povrchov, nechajte účinkovať po špecifikovanú dobu kontaktu.

- Dezinfekčné postupy prostredníctvom namáčania: Kúpeľ nie je určený na opätovné použitie. Kúpeľ používajte len raz denne po práci a denne ho vymieňajte za čerstvý roztok.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Pred vstupom do ošetrovaných priestorov zabezpečte adekvátne vetranie.

Nepoužívajte v priestoroch prístupných širokej verejnosti.

Zabráňte kontaktu s očami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Všeobecné opatrenia prvej pomoci: Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu výrobku).

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak ťažkosti s dýchaním pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je postihnutá osoba schopná prehltať. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky/poranenia: Podráždenie dýchacích ciest a iných sliznicových membrán. Riziko vážneho poškodenia očí. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: Rýchle konanie je veľmi dôležité.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo verejných vôd, oznámte to úradom.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo povrchových vôd, oznámte to úradom.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Technické opatrenia:
Je potrebné dodržať správne uzemňovacie postupy, aby sa zabránilo vzniku statickej elektriny.
Skladovacie podmienky:
Uchovávať len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
Zabráňte vysokým teplotám.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Chráňte pred mrazom.
Nekompatibilné výrobky: Silné kyseliny. Silné zásady.
Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. Ďalšie informácie

Výrobok obsahuje propán-2-ol, pre ktorý bola dohodnutá akceptovateľná expozičná koncentrácia pri inhalácii pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC

7.1 Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

MIDA SAN 334 MF

Oblasť trhu: SK

Číslo autorizácie

SK-0028978-0002 1-2

(Referenčné číslo záznamu v R4BP 3 - Vnútroštátna autorizácia)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	34,35
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	13,68

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta SPC 3: Mida San 311 KZ

1.2. Prípona čísla autorizácie

1-3

1.3 Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení v rámci meta SPC

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	49,07 - 49,07
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	19,54 - 19,54

2.2. Typ(y) úpravy v rámci meta SPC

Úprava/úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

Zabráňte vdychovaniu pár.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Noste ochranné okuliare.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Použitie 1 – Výrobky typu 02 Dezinfekcia povrchov, rozprašovanie pomocou pákového rozprašovača

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	nerelevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: huby Bežný názov: huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: mykobaktérie Bežný názov: mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: vírusy Bežný názov: adenovírus typu 5, myšací norovírus Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia: Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov pomocou pákového rozprašovača po predchádzajúcom vyčistení.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom Detailný opis: Pomocou pákového rozprašovača: po rozprášení pákovým rozprašovačom a dosiahnutí požadovaného času kontaktu sa výrobok môže utrieť papierovou alebo textilnou utierkou.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 30 ml/m ² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Aplikačná dávka: 30 ml/m ² . Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: kontaktný čas 5 minút. Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: kontaktný čas 20 minút. Frekvencia: 1 aplikácia za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné Profesionálne 750 ml fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE).

Veľkosti balenia a obalový materiál

1 l fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE).
5, 10, 22, 25 l doplnňovacie kanistre (HDPE).

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³) a malé miestnosti (10 m³):

Max. 1 aplikácia za deň.

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 9 hodín od ošetrenia.

Farmaceutické a kozmetické výrobné prevádzky:

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je povinné počas miešania a plnenia. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Použitie 2 – Výrobky typu 02 Dezinfekcia povrchov, nízkotlakové rozprašovanie

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	nerelevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: mykobaktérie Bežný názov: mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: vírusy Bežný názov: adenovírus typu 5, myšací norovírus Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: huby Bežný názov: huby Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	<p>Vnúťorné</p> <p>Vnúťorné priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov nízkotlakovým rozprašovaním po predchádzajúcom vyčistení.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: Nízkotlakové rozprašovanie Detailný opis: Nízkotlakovým rozprašovaním: po nízkotlakovom rozprašení sa výrobok nechá vyschnúť, ale neutiera sa.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 200 ml/m² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Aplikačná dávka: 200 ml/m². Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: Kontaktný čas 5 minút. Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: kontaktný čas 20 minút. Frekvencia: 1 aplikácia za deň.</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné
Veľkosti balenia a obalový materiál	5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE) 1000 l IBC (HDPE)

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas manipulácie s výrobkom je povinné používanie ochrany zraku (celotvárovej masky).

Noste ochrannú kombinézu, ktorá je nepriepustná pre biocídny výrobok.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 8 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Malé miestnosti (10 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 4 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Čisté priestory:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie je potrebné vetranie s rýchlosťou výmeny 20/h.

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Laboratóriá a biotechnológie:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Farmaceutické a kozmetické výrobné prevádzky:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Použitie 3 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia povrchov, rozprašovanie pomocou pákového rozprašovača

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: huby
Bežný názov: huby
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: mykobaktérie
Bežný názov: mykobaktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: adenovírus typu 5, myšací norovírus
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne priestory – Vo veľkoplošných kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov pomocou pákového rozprašovača po predchádzajúcom vyčistení.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom
Detailný opis:

Pomocou pákového rozprašovača: po rozprášení pákovým rozprašovačom a dosiahnutí požadovaného času kontaktu sa výrobok môže utrieť papierovou alebo textilnou utierkou.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 30 ml/m²
Riedenie (%): 0 %
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Výrobok je pripravený na použitie.
Pri izbovej teplote.
Aplikačná dávka: 30 ml/m².
Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: Kontaktný čas 5 minút.
Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: Kontaktný čas 20 minút.
Frekvencia: 1 aplikácia za deň.

Kategória(ie) používateľ'ov

Priemyselné
Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

750 ml fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE)
1 l fľaše so samostatným pákovým rozprašovačom (HDPE)
5, 10, 22, 25 l doplnovacie kanistre (HDPE)

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³) a malé miestnosti (10 m³):

Max. 1 aplikácia za deň.

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 9 hodín od ošetrenia.

Kuchyne a jedálne:

Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je povinné počas miešania a plnenia. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

* filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4 Opis použitia

Použitie 4 - Použitie 4 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia povrchov, nízkotlakové rozprašovanie

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	nerelevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: mykobaktérie Bežný názov: mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: vírusy Bežný názov: adenovírus typu 5, myšací norovírus Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: huby Bežný názov: huby Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>Vnútorne priestory – Vo veľkoplošných kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov nízkotlakovým rozprašovaním po predchádzajúcom vyčistení.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: Nízkotlakové rozprašovanie Detailný opis: Nízkotlakovým rozprašovaním: po nízkotlakovom rozprášení sa výrobok nechá vyschnúť, ale neutiera sa.</p>

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 200 ml/m²
Riedenie (%): 0 %
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Pripravené na použitie.
Pri izbovej teplote
Aplikačná dávka: 200 ml/m².
Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: Kontaktný čas 5 minút.
Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: Kontaktný čas 20 minút.
Frekvencia: 1 aplikácia za deň.

Kategória(ie) používateľov

Priemyselné

Veľkosti balenia a obalový materiál

5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE), 220 l nádoby (HDPE)
1000 l IBC (HDPE)

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.
Počas manipulácie s výrobkom je povinné používanie ochrany zraku (celotvárovej masky).
Noste ochrannú kombinézu, ktorá je nepriepustná pre biocídny výrobok.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 8 m².
Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapučňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrovaní miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Malé miestnosti (10m³):

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 4 m².
Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapučňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*
Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrovaní miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 12 hodín od ošetrenia.

Inštitucionálne kuchyne a jedálne:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².
Použitie ochranných prostriedkov dýchacích ciest s ochranným faktorom 10 je počas aplikácie povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapučňou/maskou (TH1/TM1) alebo polomaska/maska s kombinovaným plynovým filtrom/P2 (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).*

počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Priemyselné kuchyne:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².
Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

Priemyselné výrobné priestory:

Maximálne 1 aplikácia za deň na maximálne 10 m².
Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrení miestnosť opustite a znovu do nej nevstupujte, kým neuplynie 1 hodina od ošetrenia.

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5 Opis použitia

Použitie 5 - Použitie 5 – Výrobky typu 02 Dezinfekcia predmetov namáčaním

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: mykobaktérie
Bežný názov: mykobaktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: adenovírus typu 5, myšací norovírus

	Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne Vnútorne priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia: Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov (predmetov) namáčaním po predchádzajúcom vyčistení
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Namáčanie Detailný opis: Dezinfekcia nástrojov a vybavenia namáčaním (vkladaním predmetov do vopred naplnenej nádoby kúpeľa) alebo naplnením (naplnením prázdnej nádoby kúpeľa, ktorá už obsahuje predmety). V oboch prípadoch sú predmety úplne ponorené.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 25 litrov Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: Kontaktný čas 5 minút. Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: Kontaktný čas 20 minút. Frekvencia: 1 aplikácia za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	5, 10, 2 2, 25 l kanistre (HDPE)

4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Výrobok sa dá bezpečne spláchnuť do komunálnej kanalizácie napojenej na čistiareň odpadových vôd.

4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.6 Opis použitia

Použitie 6 - Použitie 6 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia predmetov namáčaním

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	nerelevantné
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: mykobaktérie Bežný názov: mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: vírusy Bežný názov: adenovírus typu 5, myšací norovírus Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: huby Bežný názov: huby Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>Dezinfekcia nástrojov a vybavenia namáčaním (vkladaním predmetov do vopred naplnenej nádoby kúpeľa) alebo naplnením (naplnením prázdnej nádoby kúpeľa, ktorá už obsahuje predmety). V oboch prípadoch sú predmety úplne ponorené.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: Namáčanie Detailný opis: Namáčanie.</p>

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 25 litrov
Riedenie (%): 0 %
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Pripravené na použitie.
Pri izbovej teplote.
Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: Kontaktný čas 5 minút.
Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: Kontaktný čas 20 minút.
Frekvencia: 1 aplikácia za deň.

Kategória(ie) používateľ'ov

Priemyselné
Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

5, 10, 22, 25 l kanistre (HDPE)

4.6.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.6.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.6.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Výrobok sa dá bezpečne spláchnuť do komunálnej kanalizácie napojenej na čistiareň odpadových vôd.

4.6.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.6.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

- Dezinfekčné postupy rozprašovaním, utieraním alebo namáčaním:

Všetky povrchy, ktoré sa majú dezinfikovať, je potrebné pred dezinfekčným postupom vyčistiť/opláchnuť/vysušiť: používateľ by mal dôkladne vyčistiť, opláchnuť a vysušiť čistiace kvapaliny z povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať.

- Dezinfekčný cyklus:

Všetky výrobky musia byť použité NEZRIEDENÉ.

Pozrite opis aplikačnej metódy súvisiacej s každým použitím, aby ste vedeli presný požadovaný ČAS KONTAKTU a to, či je po dezinfekcii potrebné ZÁVEREČNÉ OPLÁCHNUTIE (vodou z vodovodu).

- Pre dezinfekčné postupy pomocou **pákového rozprašovača**: Zabezpečte úplné namočenie povrchov, nechajte účinkovať po špecifikovanú dobu kontaktu.

- Dezinfekčné postupy prostredníctvom **namáčania**: Kúpeľ nie je určený na opätovné použitie. Kúpeľ používajte len raz denne po práci a denne ho vymieňajte za čerstvý roztok.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Pred vstupom do ošetrovaných priestorov zabezpečte adekvátne vetranie.

Nepoužívajte v priestoroch prístupných širokej verejnosti.

Zabráňte kontaktu s očami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Všeobecné opatrenia prvej pomoci: Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajú ústami. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu výrobku).

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak ťažkosti s dýchaním pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút. Volajte 112/záchranú službu kvôli lekárskej pomoci.

PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchranú službu kvôli lekárskej pomoci.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky/poranenia: Podráždenie dýchacích ciest a iných sliznicových membrán. Riziko vážneho poškodenia očí. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: Rýchle konanie je veľmi dôležité.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo verejných vôd, oznámte to úradom.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo povrchových vôd, oznámte to úradom.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Technické opatrenia:

Je potrebné dodržať správne uzemňovacie postupy, aby sa zabránilo vzniku statickej elektriny.

Skladovacie podmienky:

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

Zabráňte vysokým teplotám.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Chráňte pred mrazom.

Nekompatibilné výrobky: Silné kyseliny. Silné zásady.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. Ďalšie informácie

Výrobok obsahuje propán-2-ol, pre ktorý bola dohodnutá akceptovateľná expozičná koncentrácia pri inhalácii pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC

7.1 Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

Mida San 311 KZ

Oblasť trhu: SK

Číslo autorizácie

SK-0028978-0003 1-3

(Referenčné číslo záznamu v R4BP 3 - Vnútroštátna autorizácia)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	49,07
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	19,54

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta SPC 4: Mida San 311 KZ wipes - Saniwipe

1.2. Prípona čísla autorizácie

1-4

1.3 Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení v rámci meta SPC

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	49,07 - 49,07
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	19,54 - 19,54

2.2. Typ(y) úpravy v rámci meta SPC

Úprava/úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Uchovávajúte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

Zabráňte vdychovaniu pár.

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Noste ochranné okuliare.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Uchovávajúte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Použitie 1 – Výrobky typu 02 Dezinfekcia povrchov, vlhčené utierky

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: huby
Bežný názov: huby
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

	<p>Vedecký názov: mykobaktérie Bežný názov: mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>Vnútorne priestory - Farmaceutické odvetvia, nepotravinárske odvetvia: Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov utieraním po predchádzajúcom vyčistení.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: utieranie Detailný opis: Utieraním s komerčnými naimpregnovanými utierkami.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 1 utierka/m² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: Kontaktný čas 5 minút. Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: Kontaktný čas 20 minút. Dezinfekcia povrchov: 1 utierka/m². Častota: 1 aplikácia za deň.</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	<p>Priemyselné</p> <p>Profesionálne</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p><u>150 utierok/balenie</u>: nepriehľadné biele 1 l HDPE balenie <u>800 utierok/vedro</u>: nepriehľadné biele 15 l polypropylénové vedro <u>1500 utierok/vedro</u>: nepriehľadné biele 15 l polypropylénové vedro</p>

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 1 hodia od ošetrenia.

Malé miestnosti (10 m³):

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.
Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 3 hodiny od ošetrenia.
*Filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Použitie 2 – Výrobky typu 04 Dezinfekcia povrchov, vlhčené utierky

Typ výrobku

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

nerelevantné

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: huby
Bežný názov: huby
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: mykobaktérie
Bežný názov: mykobaktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Spôsob(y) aplikácie	<p>Vnútorne</p> <p>Vnútorne priestory – V kuchyniach, reštauráciách, potravinárskom priemysle: Dezinfekcia malých tvrdých/neporéznych povrchov utieraním po predchádzajúcom vyčistení.</p> <p>Spôsob: utieranie Detailný opis: Utieraním s komerčnými naimpregnovanými utierkami.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 1 utierka/m² Riedenie (%): 0 % Počet a časový rozvrh aplikácie: Pripravené na použitie. Pri izbovej teplote. Účinný proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám: Kontaktný čas 5 minút. Účinný proti baktériám, hubám/kvasinkám, mykobaktériám a vírusom: Kontaktný čas 20 minút. Dezinfekcia povrchov: 1 utierka/m². Frekvencia: 1 aplikácia za deň.</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	<p>Priemyselné</p> <p>Profesionálne</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p><u>150 utierok/balenie</u>: nepriehľadné biele 1 l HDPE balenie <u>800 utierok/vedro</u>: nepriehľadné biele 15 l polypropylénové vedro <u>1500 utierok/vedro</u>: nepriehľadné biele 15 l polypropylénové vedro</p>

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecný návod na použitie.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Na zmiernenie rizík sa použijú nasledujúce opatrenia, pokiaľ ich nie je možné nahradiť technickými a/alebo organizačnými opatreniami: Technické a organizačné ochranné opatrenia musia mať prednosť (osobné ochranné prostriedky sa nepovažujú za trvalé opatrenia).

Všetky typy miestností:

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Počas fázy manipulácie s výrobkom noste tvárový štít.

Nešpecifikované miestnosti (20 m³):

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 1 hodia od ošetrenia.

Malé miestnosti (10 m³):

Počas aplikácie nesmú byť prítomné nechránené nezúčastnené osoby.

Po ošetrení miestnosť opustíte a znovu do nej nevstupujete, kým neuplynie 3 hodiny od ošetrenia.

*Filter organických výparov, kombinovaný filter, typ A2/P2 (RPE10)

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

Na dezinfekčné postupy pomocou vopred impregnovaných utierok pripravených na použitie: Zabezpečte úplné navlhčenie povrchov, nechajte účinkovať po špecifikovaný čas kontaktu.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte v dobre vetraných priestoroch.
Pred vstupom do ošetrovaných priestorov zabezpečte adekvátne vetranie.
Nepoužívajte v priestoroch prístupných širokej verejnosti.
Zabráňte kontaktu s očami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Všeobecné opatrenia prvej pomoci: Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu výrobku).
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak ťažkosti s dýchaním pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Všetky kontaminované časti odevu vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ihneď oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte v oplachovaní aspoň 15 minút. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.
PO POŽITÍ: Ihneď vypláchnite ústa. Ak je vystavená osoba schopná prehĺtať, podajte jej niečo na pitie. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte 112/záchrannú službu kvôli lekárskej pomoci.
Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Príznaky/poranenia: Podráždenie dýchacích ciest a iných sliznicových membrán. Riziko vážneho poškodenia očí. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania: Rýchle konanie je veľmi dôležité. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo verejných vôd, oznámte to úradom.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd. Ak výrobok prenikne do kanalizácie alebo povrchových vôd, oznámte to úradom.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Technické opatrenia:
Je potrebné dodržať správne uzemňovacie postupy, aby sa zabránilo vzniku statickej elektriny.
Skladovacie podmienky:
Uchovávať len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
Zabráňte vysokým teplotám.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Chráňte pred mrazom.
Nekompatibilné výrobky: Silné kyseliny. Silné zásady.
Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. Ďalšie informácie

Výrobok obsahuje propán-2-ol, pre ktorý bola dohodnutá akceptovateľná expozičná koncentrácia pri inhalácii pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC

7.1 Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

Mida San 311 KZ wipes

Oblasť trhu: SK

Číslo autorizácie

SK-0028978-0004 1-4

(Referenčné číslo záznamu v R4BP 3 - Vnútroštátna autorizácia)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-1-ol		Účinná látka	71-23-8	200-746-9	49,07
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	19,54
